



't Ossehoofd

Berckheidelaan 8
1701 VG Heerhugowaard
Tel.: 072 - 5744959
IBAN: NL28 INGB0003171901



STERKLINIEK
dierenartsen

BIJSLUITER

Productnaam: **Scalibor Protectorband 4% w/w/ 65 cm
antiparasitaire halsband voor grote honden**

Leverancier:

Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001AC
Weert Nederland

1. Naam en adres van de houder voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

2. Benaming van het diergeneesmiddel

3. Gehalte aan werkza(a)m(e) en overige bestandd(e)l(en)

4. Indicatie(s)

5. Contra-indicaties

6. Bijwerkingen

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm halsband voor grote honden Deltamethrin

Per halsband van 70 cm (45 g) Imidacloprid 4,5g Flumethrine 2,03g Grijs, geurloze halsband

Bestrijding van infestaties met teken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) gedurende 5 tot 6 maanden.
Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-feeding effect op volwassen muggen (*Culex pipiens pipiens*) gedurende 6 maanden.

Niet gebruiken bij: -Pups jonger dan 7 weken. -Honden met huidlaesies. -Dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroiden. -Katten. NIET GEBRUIKEN BIJ KATTEN

In zeldzame gevallen kunnen lokale huidreacties (jeuk, erytheem, haaruitval) in de hals of van de huid in het algemeen waargenomen worden die mogelijk op een lokale of algemene overgevoeligheidsreactie wijzen. In zeer zeldzame gevallen kan afwijkend gedrag (bv. lethargie of hyperactiviteit), vaak geassocieerd met huidirritatie, waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen kunnen gastro-intestinale symptomen zoals braken, diarree en hypersalivatie waargenomen worden. In zeer

zeldzame gevallen kunnen neuromusculaire problemen zoals ataxie en spiertremoren waargenomen worden. De symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur na het afdoen van de halsband. De halsband verwijderen als een van deze symptomen zich voordoet. Behandeling dient symptomatisch te zijn aangezien er geen specifiek antidotum bekend is. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: - zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerkingen gedurende de duur van één behandeling) - vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren) - soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren) - zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren) - zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde meldingen). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. doeldiersoort(en)

Hond.

8. Dosering voor elke doeldiersoort, toedienings-weg(en) en wijze van gebruik

De 65 cm lange halsband is voor gebruik bij grote honden. Voor bevestiging om de hals. Eén halsband per hond. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Verwijder de halsband uit het dichtgesealde sachet en breng deze losjes rond de hals van de hond aan. Houd 2 platte vingers ruimte tussen de band en de hals van de hond. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp..

10. Wachtijd(en)

Niet van toepassing.

11. Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. De halsband in dichtgesealde sachet dient bewaard te worden in de kartonnen buitenverpakking. Bewaren beneden 25°C. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het doosje en het sachet.

12. Speciale waarschuwing(en)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van infectieuze ziekten door teken of zandvliegen daarom niet volledig worden uitgesloten. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de symptomen verdwenen zijn. Het effect van wassen op de duur van de

werkzaamheid van het diergeneesmiddel is niet onderzocht. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient: Na het omdoen van de halsband de handen goed wassen met koud water en zeep. Personen met een bekende overgevoeligheid voor bestanddelen van de halsband moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Voorkom dat kinderen, met name kinderen jonger dan 2 jaar, de band aanraken, ermee spelen of in hun mond stoppen. Men moet ervoor zorgen dat jonge kinderen geen intensief contact hebben, zoals slapen, met honden die een band dragen. Bewaar het dichtgesealde sachet met de halsband in de kartonnen buitenverpakking tot gebruik. Overige voorzorgsmaatregelen: Hoewel de werking van de halsband niet vermindert als deze af en toe in contact komt met water dient de halsband altijd verwijderd te worden voordat de hond gaat zwemmen of wordt gewassen, omdat de werkzame stof schadelijk is voor vissen en andere waterorganismen. Men moet voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen dat de hond de halsband draagt. Dracht: Kan tijdens de dracht worden gebruikt. Lactatie: Kan tijdens de lactatie worden gebruikt. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Niet gebruiken in combinatie met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband opeet, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, trillen, kwijlen, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Indien nodig kan symptomatisch behandeld worden met diazepam

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu. Het diergeneesmiddel of de verpakking dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

14. De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Vrij

15. Overige informatie

Geen