



Tips & tricks tegen vlooien bij huisdieren: het vlooienbestrijdingsplan.

Warme, vochtige dagen in een omgeving waar mens en dier verblijven zijn dé trigger voor het losbreken van ware vlooienplagen. Daarom volgen hieronder tips & tricks die u klanten kunnen helpen met uw plan van aanpak. Volg nauwkeurig de stappen 1 tot en met 5 en herhaal indien nodig

Stap 1 Behandel al de huisdieren met advantage® spot on:

Je ziet niet altijd vlooien op het huisdier. De volwassen vlooien bevinden zich net als alle andere vlooienstadia (eitjes, larven en poppen) voornamelijk in de omgeving. Een deel van de volwassen vlooien op het huisdier worden bij het likken en bijten ingeslikt en belanden in de maag. Diagnose van vlooien: plaats het huisdier op een witte vochtige doek en strijk tegen de haren in. Zwarte schilfers (vlooienuitwerpselen) die uit de vacht vallen en rood (onverteerd bloed) verkleuren duiden op de aanwezigheid van vlooien. Aanpak: behandel het huisdier vanaf 8 weken met advantage® spot on volgens het gewicht en herhaal na 3 weken voor katten en na 4 weken voor honden, vooral gedurende de warmere maanden (ook in de herfst zijn er nog vlooienplagen!). Vergeet ook de andere huisdieren (konijn, hamster, cavia,...) niet. Zodra de vlo in contact komt met de werkzame stof zal zij stoppen met bijten en sterven. Adviseer altijd om aandachtig de volledige bijsluiter te lezen vooraleer het dier te behandelen.

Behandel het huisdier met advantage® spot on volgens het gewicht en herhaal na 3 weken voor katten en na 4 weken voor honden. Zorg ervoor dat het dier zich niet kan aflikken of dat de dieren elkaar kunnen aflikken.

 <p>Druk de haren op de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.</p>	 <p>De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen. Voor honden van meer dan 25 kg: De gehele inhoud van de pipet(ten) moet gelijkmatig op drie tot vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis bij de rechtstaande hond.</p>
--	---

Opgelet: Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Tip: laat op de kalender noteren wanneer het huisdier opnieuw behandeld moet worden.

**U kan ook Advantix[®] pipetten aanbevelen bij honden (niet bij katten gebruiken) dan zijn worden naast vlooiën ook teken aangepakt of het voorschriftplichtige Advocate[®] (pipetten) waarbij menginfestaties van vlooiën, andere ectoparasieten en ronde wormen worden aangepakt.*

Stap 2 Reinig grondig de omgeving :

Adviseer: gooi weg wat je kan weggooiden, was wat je kan wassen, dweil vloeren goed nat, stofzuig herhaaldelijk tapijten, zetels enz.. en geef bijzondere aandacht aan hoeken, kieren en spleten. Op deze plaatsen verschuilen de lichtschuwe vlooiënlarven zich immers. Door reinigen worden vlooiën, vlooiëneieren of vlooiënlarven weggehaald uit de omgeving. Vergeet ook niet de garage, het tuinhuis of de auto(koffer). Herhaal deze reiniging zo vaak als nodig. Gooi de stofzuigerzak weg bij het restafval.

Stap 3 Behandel de omgeving met Fleegard[®] spray:

Fleegard[®] 250 ml spray en Fleegard[®] 150 ml fogger werken beiden tegen volwassen vlooiën en stoppen de ontwikkeling van de larven die sterven voordat ze volwassen vlooiën worden (groeiremmer). Fleegard[®] spray : lees voor gebruik het etiket. Breng Fleegard[®] spray aan op de vooraf gereinigde plaatsen waar huisdieren frequent verblijven zoals ligplaatsen, maanden, de zetel. Hoeken, achter plinten, spleten en kieren verdienen een bijzonder aandacht. Doe altijd vooraf een kleine test bij delicate stoffen (tapijten, kledij, zetels,..) . Vergeet de kofferruimte van de wagen niet, de kelder, de zolder, het tuinhuis of alle andere plaatsen waar het huisdier kan komen. Vermijd direct contact met eet en drinkwaren. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is bij het aanbrengen. Keukengerei, etenswaren, aquaria en vogelkooien moeten worden verwijderd of afgedekt. Laat minimaal ½ uur inwerken met gesloten ramen en deuren en verlaat zelf de ruimte tijdens de inwerking. Laat ook het huisdier niet achter in de behandelde ruimte. Laat de ruimte goed ventileren vooraleer deze terug in gebruik te nemen. Indien er gereinigd wordt dan wordt het product weggehaald en moet het product opnieuw worden toegepast.

Stap 4 Behandel de omgeving met Fleegard[®] fogger

Fleegard[®] fogger : lees voor gebruik het etiket. Plaats nadien een Fleegard[®] fogger in de ruimte op bijvoorbeeld een stuk krantenpapier. De 150 ml fogger kan volstaat voor een ruimte van minstens 30 m³ (overeenkomend met een oppervlakte van 15 m² bij een minimum hoogte van 2 m) tot hoogstens 100 m³ (overeenkomend met een oppervlakte van 50 m² bij een minimum hoogte van 2 m). Gebruik voor grotere ruimtes meerdere foggers. Plaats de fogger rechtop in het midden van de te behandelen ruimte. De directe ondergrond rondom de spuitbus zal normaal nat worden door het druipen van de spuitnevel. Activeer de automatische vrijstelling door hard te duwen om de verzegeling van de spuitkop te verbreken. Verlaat de ruimte tijdens de behandeling. Laat ook uw huisdier niet achter in de behandelde ruimte. De spuitbus leegt zich binnen ongeveer 3 minuten. De behandelde ruimte goed gesloten houden gedurende 4 uur. De behandelde ruimte goed ventileren (minstens 1 uur) vooraleer deze weer in gebruik te nemen. Het herhalen van de behandeling het jaar door wordt aanbevolen. Indien er gereinigd wordt dan wordt het product weggehaald en moet het opnieuw worden toegepast.

Stap 5 Herhaal stap 1 tot en met stap 4 zolang als nodig en wees geduldig. Voorkom dat uw huisdier nieuwe vlooiënbesmettingen meebrengt door een preventieve behandeling.

Wanneer moet de bestrijding herhaald worden?

- Er zijn opnieuw vlooiën: als in het verloop van de volgende dagen het probleem zich herhaalt moet de bestrijding herbegonnen worden (omgeving reinigen, omgeving behandelen, honden herbehandelen met Advantage[®] na 4 weken, katten na 3 weken).
- Ik zie geen vlooiën meer: bij de volgende schoonmaak moet u zich realiseren dat u de Fleegard[®] spuitfilm verwijdert. Uit voorzorg kan overwogen worden om de toepassing te herhalen.

Moet ik s'anderendaags de woning opnieuw reinigen om het laagje van de Fleegard[®] spray of de Fleegard[®] Fogger te verwijderen? Neen, bij schoonmaken wordt de werkzame stof weggehaald en dient de toepassing herbegonnen te worden. Alleen als het probleem zich herhaalt moet de bestrijding herbegonnen worden (omgeving reinigen, omgeving behandelen, herbehandelen met Advantage[®] honden na 4 weken, katten na 3 weken).

Wat bij falen van de behandeling? Neem dan contact op met Bayer tel 02 535 66 53- tel 02 535 66 54

Waarom komen vlooiën jaar na jaar terug? Wilde dieren herbergen vlooiën en vormen een reservoir voor gezelschapsdieren.

Herhaling van de vlooiencyclus: Om te begrijpen hoe je het best te werk kunt gaan, moet je weten hoe vlooiën leven: de vlooiencyclus. Volwassen vlooiën leven op het huisdier. De vrouwelijke vlo prikt met behulp van een steeksnuut door de huid om bloed te zuigen. Om te zorgen dat het bloed niet stolt in de snuit spuit de vlo daarvoor eerst een anti-stollingsstof in. Deze anti-(bloed) stollingsstof zorgt bij sommige dieren (maar ook mensen) voor allergie tegen vlooiënbeten waardoor erge jeuk optreedt maar ook ziekten kunnen worden overgedragen. Vlooiën leggen in hun leven tot wel 600 eitjes. Deze blijven in tegenstelling tot luizeneitjes (neten) niet kleven aan de haren. Vlooieneitjes komen terecht op plaatsen waar het dier zich vaak bevindt: de mand, de bench, het tapijt en noem maar op. Na verloop van tijd komen er larven uit de eitjes. Die zien er uit als heel kleine doorschijnende wormpjes. Larven houden niet van licht. Daarom kruipen ze weg en verschuilen ze zich op donkere plekken. Ze zitten bijvoorbeeld diep in het tapijt, onder het parket, in kieren en onder meubels. Net als een rups, spint ook de larve van de vlo op zeker moment een dikke witte cocon om zich heen. In die cocon vindt de gedaanteverwisseling plaats van larve naar volwassen vlo. Geprikkeld door uitgedemde lucht, warmte, licht en trillingen komt de vlo ten slotte uit de cocon tevoorschijn. De jong volwassen vlo is nu klaar om een nieuwe prooi te bespringen, deze te steken, bloed te zuigen en eitjes te leggen. Daarmee is de vlooiencyclus rond. Als je weet dat alleen volwassen vlooiën op het huisdier komen als ze bloed zuigen, is het makkelijk te begrijpen dat 95% tot 99% van alle vlooiën zich ergens in het huis bevindt – en niet op de hond of kat. Als je volwassen vlooiën ziet lopen op het dier zijn dieren al heel erg besmet (en is dit dus maar het topje van de ijsberg) want de vele vlooiën worden door bijten en likken ingeslikt of bevinden zich in de omgeving.

Conclusie:

Vlooiënbestrijding is complex, het wassen of sprayen van dieren of het plaatsen van een insecticide bus alleen is onvoldoende. Er is steeds een grondig plan van aanpak nodig.

Bron: Anne-Catherine Dalemans 08/08/2014

VERKORTE BIJSLUITERS (augustus 2014)

Advantage Dog- Indicaties: Voor de preventie en de behandeling van vlooiën en voor de behandeling van bijtende luizen (*Trichodectes canis*) bij honden. Op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooiënbesmetting gedurende 4 weken. Voor de behandeling van bijtende luizen dient éénmalig een dosis te worden toegediend. **Contra-indicaties :** Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. **Bijwerkingen :** Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. **Dosering:** De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooiën en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Bij infestaties met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. Verpakking : Blisterverpakking met 4 eenheidsdosis tubes.

Advantage Cat, Indicaties: Voor de preventie en de behandeling van vlooiën bij katten. Voor katten van 4 kg lichaamsgewicht en meer, gebruik Advantage®Cat 80. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooiënbesmetting gedurende 4 weken. **Contra-indicaties :** Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. **Bijwerkingen :** Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij katten ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. **Dosering:** De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooiën en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Bij infestaties met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. Verpakking : Blisterverpakking met 4 eenheidsdosis tubes.

Advantix® (alleen voor honden) Indicaties: Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*). Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Het product heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (*Rhipicephalus sanguineus* en *Ixodes ricinus* voor 4 weken en *Dermacentor reticulatus* voor 3 weken). Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen 2 dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen. Een behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (*Phlebotomus papatasi* voor 2 weken en *Phlebotomus perniciosus* voor 3 weken), tegen muggen (*Aedes aegypti* voor 2 weken en *Culex pipiens* voor 4 weken) en tegen stalvlieg (*Stomoxys calcitrans*) gedurende 4 weken. **Contra-indicaties:** In afwezigheid van beschikbare gegevens zou het product niet mogen gebruikt worden bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht voor Advantix 40, van minder dan 4,0 kg lichaamsgewicht voor Advantix 100, van minder dan 10 kg lichaamsgewicht voor Advantix 250 en van minder dan 25 kg lichaamsgewicht voor Advantix 400. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid aan de actieve stoffen of één van de hulpstoffen. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huid-overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen. In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejack of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en spiertrillingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf. Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen. In dit geval kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch moeten zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend. **Dosering en wijze van toediening:** De aanbevolen minimale dosis is: 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine. *Doseringsschema voor Advantix spot-on:*

Honden (kg LG)	Merknaam	Volume (ml)	Imidacloprid (mg/kg LG)	Permethrine (mg/kg LG)
≤ 4 kg	Advantix 40/200 spot-on solution voor honden	0,4 ml	minimaal 10	minimaal 50
> 4 ≤ 10 kg	Advantix 100/500 spot-on solution voor honden	1,0 ml	10 - 25	50 - 125
> 10 ≤ 25 kg	Advantix 250/1250 spot-on solution voor honden	2,5 ml	10 - 25	50 - 125
> 25 ≤ 40 kg	Advantix 400/2000 spot-on solution voor honden	4,0 ml	10 - 16	50 - 80

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

Om herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien te verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden ook met een geschikt product behandeld moeten worden. Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun ontwikkelingsstadia aanbevolen.

Het product blijft doeltreffend als het dier nat wordt. Echter, langdurige intensieve blootstelling aan water zou vermeden moeten worden. In gevallen van frequente blootstelling aan water zou de persisterende doeltreffendheid verminderd kunnen zijn. In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als de hond een shampoobeurt nodig heeft, zou dit beter vóór de behandeling met Advantix plaatsvinden of tenminste twee weken erna, om de doeltreffendheid van het product optimaal te houden. Bij besmetting met bijtende luizen, wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. Uitsluitend voor gebruik op de huid. Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid. Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen. Voor honden tot 10 kg lichaamsgewicht: Terwijl de hond stilstaat de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen. Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht: Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen. **Niet gebruiken bij katten.**

Advocate® spot-on oplossing voor honden (100 mg/ml imidacloprid en 25 mg/ml moxidectine). Indicaties: Voor honden die lijden aan, of risico lopen op, gemengde parasitaire infecties: Voor de preventie en behandeling van vlooiënbesmetting (*Ctenocephalides felis*), voor de behandeling van bijtende luizen (*Trichodectes canis*), van oormijtinfestatie (*Otodectes cynotis*), schurft (*Sarcoptes scabiei* var. *Canis*), demodicosis veroorzaakt door *Demodex canis*, voor de preventie van hartworm (L3 en L4 larven van *Dirofilaria immitis*), voor de preventie van *Angiostrongylus vasorum* (angiostrongylosis) (L4 larven en onvolgroeide stadia), voor de behandeling van *Angiostrongylus vasorum* (angiostrongylosis), de behandeling van *Crenosoma vulpis*, voor de behandeling van circulerende microfilariae (*Dirofilaria immitis*), voor de preventie van cutane dirofilariosis (L3 larven van *Dirofilaria repens*), voor de vermindering van circulerende microfilariae (*Dirofilaria repens*), voor de preventie van spirocercosis (*Spirocerca lupi*) en voor de behandeling van infecties met gastro-intestinale nematoden (L4 larven, onvolgroeide en volwassen stadia van *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* en *Uncinaria stenocephala*, volwassen *Toxascaris leonina* en *Trichuris vulpis*). Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooiën veroorzaakte allergische dermatitis (FAD). Contra-indicaties: Niet gebruiken bij puppies jonger dan 7 weken. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. Bij katten moet het corresponderende product 'Advocate voor katten' gebruikt worden, dat 100 mg/ml imidacloprid en 10 mg/ml moxidectine bevat. Bijwerkingen: Het gebruik van het product bij honden kan gepaard gaan met een voorbijgaande jeuk. In zeldzame gevallen kunnen vettig haar, erythema en braken voorkomen. Deze symptomen verdwijnen zonder verdere behandeling. In zeldzame gevallen kan het product een lokale overgevoelighedsreactie veroorzaken. Wanneer het dier na de behandeling de plaats van toediening likt, kunnen in incidentele gevallen voorbijgaande neurologische symptomen waargenomen worden (zie rubriek 4.10). Het product smaakt bitter en speeksel kan voorkomen wanneer het dier de plaats van toediening likt onmiddellijk na behandeling. Dit is geen symptoom van intoxicatie en verdwijnt na enige minuten zonder behandeling. Correct gebruik minimaliseert de mogelijkheid voor het dier de toedieningsplaatsen te likken. In zeer zeldzame gevallen kan het product ter hoogte van de toedieningsplaats een sensatie veroorzaken, resulterend in voorbijgaande gedragsveranderingen (zoals sloomheid, agitatie of gebrek aan eetlust). Dosering: Doseringsschema: De aanbevolen minimumdosis bedraagt 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid en 2,5 mg/kg

lichaamsgewicht moxidectine, equivalent aan 0,1 ml/kg lichaamsgewicht Advocate voor honden. Het behandelingsschema dient gebaseerd te worden op de lokale epidemiologische situatie. Voorschriftplichtig.

Advocate® spot-on oplossing voor kleine katten en fretten of voor grote katten (100 mg/ml imidacloprid en 10 mg/ml moxidectine). Indicaties: voor katten die lijden aan, of risico lopen op, gemengde parasitaire infecties: Voor de preventie en behandeling van vlooiënbesmetting (*Ctenocephalides felis*), voor de behandeling van oormijtinfestatie (*Otodectes cynotis*), voor de preventie van hartworm (L3 en L4 larven van *Dirofilaria immitis*) voor de behandeling van notoedrische schurft (*Notoedres cati*) en voor de behandeling van infecties met gastro-intestinale nematoden (L4 larven, onvolgroeide en volwassen stadia van *Toxocara cati* en *Ancylostoma tubaeforme*). Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een behandlungsstrategie tegen door vlooiën veroorzaakte allergische dermatitis (FAD). Indicaties: voor Fretten die lijden aan, of risico lopen, op gemengde parasitaire infecties: Voor de preventie en behandeling van vlooiënbesmetting (*Ctenocephalides felis*), en voor de preventie van hartworm (L3 en L4 larven van *Dirofilaria immitis*). Contra-indicaties: Niet gebruiken bij kittens jonger dan 9 weken. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. Bij fretten: Advocate voor Grote Katten (0,8 ml) of Advocate voor Honden (alle sterktes) niet gebruiken. Bij honden moet het corresponderende product 'Advocate voor honden' gebruikt worden, dat 100 mg/ml imidacloprid en 25 mg/ml moxidectine bevat. Bij fretten: Advocate® voor honden niet gebruiken. Enkel 'Advocate voor kleine katten en fretten' (0,4 ml) mag gebruikt worden. Bijwerkingen (frequentie en ernst): Het gebruik van het product bij katten kan gepaard gaan met een voorbijgaande jeuk. In zeldzame gevallen kunnen een vettige vacht, erythema en braken voorkomen. Deze symptomen verdwijnen zonder verdere behandeling. In zeldzame gevallen kan het product een lokale overgevoelighedsreactie veroorzaken. Wanneer het dier na de behandeling de plaats van toediening likt, kunnen in incidentele gevallen voorbijgaande neurologische symptomen waargenomen worden (zie rubriek 4.10). Het product smaakt bitter en speekselen kan voorkomen wanneer het dier de plaats van toediening likt onmiddellijk na behandeling. Dit is geen symptoom van intoxicatie en verdwijnt na enige minuten zonder behandeling. Correct gebruik minimaliseert de mogelijkheid voor het dier de toedieningsplaats te likken. In zeer zeldzame gevallen kan het product ter hoogte van de toedieningsplaats een sensatie veroorzaken, resulterend in voorbijgaande gedragsveranderingen (zoals sloomheid, agitatie of gebrek aan eetlust). Dosering. Doseringsschema bij katten: De aanbevolen minimumdosis bedraagt 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid en 1,0 mg/kg lichaamsgewicht moxidectine, equivalent aan 0,1 ml/kg lichaamsgewicht Advocate voor katten. Doseringsschema bij Fretten: Een pipet Advocate spot-on oplossing voor Kleine Katten (0,4 ml) per dier. De aanbevolen dosis niet overschrijden. Het behandelingsschema dient gebaseerd te worden op de lokale epidemiologische situatie. Voorschriftplichtig

BOLFO Fleegard® **Fogger Naam en gehalte van elke werkzame stof:** Pyriproxifen (CAS 95737-68-1) 0,05%, cyfluthrin (CAS 68359-37-5) 0,04% **Aard van het preparaat:** Spuitbus met automatisch leeploopventiel **Aard van de werking:** Insecticide **Naam van andere gevaarlijke stoffen (gehalte in gewichtsprocent** Isopropanol (15,00%), Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt (39,91%) Propaan/butaan (15:85) (45,00%) **Gebruik waarvoor het product toegelaten is** Productsoort 18: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooiënbestrijdingsmiddel als 'One Shot' in woonruimten en andere ruimten voor zover een direct contact met eet- en drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan is uitgesloten en waar tijdens de toepassing geen personen of dieren verblijven. **Gebruiksaanwijzing** Een 150 ml fogger kan gebruikt worden voor een ruimte van minstens 30 m³ (overeenkomend met een oppervlakte van 15 m² bij een minimum hoogte van 2 m) tot hoogstens 100 m³ (overeenkomend met een oppervlakte van 50 m² bij een minimum hoogte van 2 m). Gebruik voor grotere ruimtes meerdere foggers. Verwijder mensen en huisdieren uit de te behandelen ruimte. Sluit ramen en deuren. Plaats de fogger rechtop in het midden van de te behandelen ruimte. De directe ondergrond rondom de spuitbus zal normaal nat worden door het druipen van de spuitnevel. Activeer de automatische vrijstelling door hard te duwen

om de verzegeling van de spuitkop te verbreken. Verlaat de ruimte tijdens de behandeling. De spuitbus leegt zich binnen ongeveer 3 minuten. Verblijf niet in de ruimte tijdens de behandeling. De behandelde ruimte goed gesloten houden gedurende 4 uur. De behandelde ruimte goed ventileren gedurende minstens 1 uur vooraleer deze weer in gebruik te nemen. Het herhalen van de behandeling het jaar door wordt aanbevolen. Voor een doeltreffende vlooiënbestrijding is ook een behandeling van alle aanwezige honden en katten in de woning noodzakelijk met een daartoe bestemd product. **Bijzondere gevaren:** irriterend voor de huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. **Veiligheidsaanbevelingen:** Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Toelatingsnummer 1699 B. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

BOLFO FLEEGARD® Spray: Insecticide tegen larven en volwassen vlooiën in woningen. Lange nawerking indien de spuitfilm van de behandelde oppervlakken niet verwijderd wordt. **Wettelijk gebruiksvorschrift:** Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooiënbestrijdingsmiddel voor pleksgewijze toepassing in woonruimten en andere ruimten voor zover een direct contact met eet- en drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan is uitgesloten. **Eigenschappen** De combinatie van twee werkzame bestanddelen in Bolfo Fleegard® Spray geeft een dubbele werking: direct en langdurig. Cyfluthrin, een insecticide van de laatste generatie pyrethroïden, doodt onmiddellijk de volwassen vlooiën. Pyriproxyfen, een molecule uit de laatste generatie groeiregulatoren voor insecten, stopt de ontwikkeling van de larven die sterven vooraleer ze het volwassen vlooiënstadium bereiken. Bolfo Fleegard® Spray elimineert op deze wijze alle vlooiën die zich in de directe leefomgeving van uw huisdieren verschuilen en verhindert maandenlang elke herbesmetting. **Gebruiksaanwijzing** Sluit ramen en deuren van de te behandelen ruimte. Vanop 20 cm afstand Bolfo Fleegard® Spray spuiten op die plaatsen waar honden en katten regelmatig vertoeven. Deze plaatsen, waar de volwassen vlooiën en hun larven zich verschuilen, zijn vooral de directe leefomgeving van het dier (bv. het mandje) alsook kieren en spleten in de vloer of in het parket en achter plinten. Het product is niet bestemd voor een totale oppervlaktebehandeling. Spuit enkele seconden per plek. Verlaat de ruimte na de behandeling en laat ongeveer een ½ uur inwerken. Daarna de ruimte goed ventileren vooraleer deze weer in gebruik te nemen. Voor een doeltreffende vlooiënbestrijding is ook een behandeling van alle aanwezige honden en katten in de woning noodzakelijk met een daartoe bestemd product. Bolfo Fleegard® Spray is NIET geschikt voor het rechtstreeks bespuiten van honden of katten. **Bijzondere gevaren** Houder onder druk. Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Zeer giftig voor bijen, vissen en schaaldieren. **Veiligheidsaanbevelingen;** Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Behandelde ruimten goed ventileren vooraleer ze weer in gebruik te nemen. Handen wassen na toepassing. Keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen uitschakelen. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk afval of bijzonder afval brengen. **Eerste hulp:** Na overmatig inademen: frisse lucht inademen; raadpleeg een arts indien men zich onwel voelt. Na aanraking met de huid: wassen met water en zeep. Na aanraking met de ogen: overvloedig spoelen met water; bij blijvende pijn raadpleeg een oogarts. Gebruik biociden veilig – lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Aard van het preparaat: aerosol (AE) Werkzame stoffen: cyfluthrin, pyriproxyfen Gehalten: resp. 0,04 % en 0,05 % Toxicologische groep: synthetisch pyrethroïde en fenylether. Toelatingsnummer: 1699 B Inhoud: 170 g / 250 ml. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.