

10 manieren om stress bij katten te verlagen

Stress kan een belangrijke rol spelen bij FIC. Zo kunt u stress helpen verlagen.

1. Creëer hoge plekken en privéruimtes
2. Creëer een schuilplek waar uw kat zich veilig kan voelen
3. Zorg dat elke kattenbak schoon en groot genoeg is – minimaal 1,5 x de lichaamslengte van uw kat
4. Zet kattenbakken ver uit de buurt van voerbakjes en op rustige plekken
5. Beloon goed gedrag – straf uw kat niet voor ongelukjes
6. Geef uw kat iets om aan te krabben, hierdoor komen feromonen vrij die haar een geluksgevoel geven
7. Zorg dat ze in vorm blijft – katten met overgewicht kunnen niet goed bewegen of spelen
8. Creëer een speelplek met speeltjes om haar actief te houden
9. Binnenkatten kunnen zich gaan vervelen, dus geef uw kat zicht op de buitenwereld
10. Als u meerdere katten heeft, zorg dan dat er voor alle katten voldoende eten, water, kattenbakken en veilige plekjes zijn!

Meer weten?

Bezoek www.hillspet.nl/10TipsTegenKattenStress of www.hillspet.be/10TipsTegenKattenStress

Hill's™ Prescription Diet™ productassortiment



c/d™ Urinary Stress

- Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de terugkeer van FIC-symptomen met 89% vermindert³
- Bevat ingrediënten om stress te beheersen
- Verkrijgbaar als droogvoer en in maaltijdzakjes met twee heerlijke smaken



c/d™ Multicare

- Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het struvietstenen oplost in slechts 14 dagen
- Ook verkrijgbaar in **Reduced Calorie** voor katten met overgewicht en aanleg voor obesitas
- Verkrijgbaar als droogvoer en als natvoer in blik of in maaltijdzakjes met verschillende heerlijke smaken



c/d™

- Remt de terugkeer van blaasstenen en kristallen



s/d™

- Lost struvietblaasstenen op




Uw dierenarts kan een andere variant van Prescription Diet™ aanraden, afhankelijk van de aandoening van uw huisdier.

3. Kruger JM, Lulich JP, Merrills J e.a. Eenjarig prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek naar voeding bij idiopathische cystitis bij katten. Proceedings. ACVIM Forum 2013.

Hoe begint u met de nieuwe voeding?

- Introduceer de nieuwe voeding geleidelijk over een periode van 7 dagen
- Meng het nieuwe voer door het huidige voer van uw huisdier; gebruik een steeds grotere hoeveelheid van het nieuwe voer totdat alleen het nieuwe voer overblijft
- Raadpleeg altijd de aanbevolen voedingshoeveelheden op de verpakking



Dit is slechts een algemene richtlijn. Uw dierenarts zal een plan voor overstappen aanbevelen dat is afgestemd op de behoeften van uw huisdier.

Advies

Naam van het huisdier:

Aanbevolen voeding en dagelijkse hoeveelheid voer:

Periode:

Volgende afspraak:

Opmerkingen:

Ga voor meer informatie naar www.hillspet.nl/urinewegen of www.hillspet.be/urinewegen



Clinical Nutrition to Improve Quality of Life™



™Handelsmerken in eigendom van Hill's Pet Nutrition, Inc. © 2014



Helpt bij de ondersteuning van GEZONDE URINEWEGEN



Wetenschappelijk bewezen voeding om de gezondheid van de urinewegen te ondersteunen

238205 214015 NL 121738

De ideale voeding voor de behandeling van FIC¹ bij uw kat

c/d™ Urinary Stress

- Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het **de terugkeer van FIC-symptomen** met 89% vermindert²
- Bevat L-tryptofaan en melkeiwithydrolysaat **om stress te beheersen**, een bekende risicofactor voor FIC
- Hoge gehalten aan omega 3-vetzuren om **ongemak te helpen verminderen**
- Ideaal als voeding voor de **lange termijn**, zelfs voor huishoudens met **meerdere katten**
- Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het **struvietstenen oplost** in slechts 14 dagen
- **Verkrijgbaar in droogvoer en in maaltijdzakjes met malse stukjes in saus:**



met Kip met Zalm

1. FIC staat voor Feline Idiopathic Cystitis (Idiopathische Cystitis bij katten);
2. Kruger JM, Lulich JP, Merrills J, e.a. Eenjarig prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek naar voeding bij idiopathische cystitis bij katten. Proceedings. ACVIM Forum 2013.

Wat is LUTD?

Een aandoening van de lagere urinewegen (LUTD) is een algemene term voor verschillende infecties, ontstekingen en andere aandoeningen die de urinewegen van uw huisdier aantasten. Soms wordt LUTD veroorzaakt door blaasstenen. Veel voorkomende typen stenen zijn struviet- en calciumoxalaatstenen.



Risicofactoren

Stress

Stress kan een belangrijke rol spelen bij Idiopathische Cystitis bij katten (FIC), het meest voorkomende type LUTD onder katten.

Overgewicht

Huisdieren met overgewicht lopen meer risico op LUTD.

Ras

Bij Dwergschnauzers, Dalmatiërs, Perzen en bepaalde andere rassen is de kans op het ontstaan van blaasstenen groter.

Bepaalde voeding

Sommige voeding bevat hoge gehalten aan bepaalde mineralen, waardoor blaasstenen kunnen ontstaan.

Te weinig drinken

Als huisdieren minder drinken wordt hun urine geconcentreerder, wat de kans op steenvorming verhoogt.

Heeft uw huisdier een urinewegaandoening?

Verschijselen

- 'Ongelukjes' buiten de kattenbak
- Veelvuldige pogingen om te plassen
- Bloed in de urine
- Moeite om te plassen of pijn bij het plassen:



Manieren om aandoeningen aan de urinewegen aan te pakken

Als uw kat niet goed plast, kan het urinekanaal geblokkeerd zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw dierenarts omdat dit een urgente aandoening is die fataal kan zijn als deze onbehandeld blijft. Uw dierenarts kan medicijnen voorschrijven en kan u ook adviseren uw huisdier therapeutische voeding te geven, omdat de juiste voeding kan helpen een snel herstel te bevorderen.

Zorg dat uw huisdier thuis meer gaat drinken. Houd de kattenbak schoon en laat honden regelmatig uit. Vraag ook aan uw dierenarts of uw huisdier moet afvallen.

Hoe kan voeding helpen?

Wat u uw huisdier te eten geeft, speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van de gezondheid van de urinewegen.

Waarom Hill's™ Prescription Diet™ voeding?

Prescription Diet™ is een wetenschappelijk bewezen huisdiervoeding en wordt aanbevolen door dierenartsen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de specifieke gezondheid van uw huisdier, zonder in te leveren op de smaak. Prescription Diet helpt bij de behandeling van verschillende soorten LUTD, waardoor uw huisdier geniet van een betere levenskwaliteit.

Wetenschappelijk bewezen voeding

- Helpt de juiste zuurgraad (pH) van de urine te creëren om stenen op te lossen en de vorming van nieuwe stenen te voorkomen
- Samengesteld met ingrediënten die de mineralen waaruit blaasstenen ontstaan, helpen verminderen
- Bevat ingrediënten voor de beheersing van stress, een bekende risicofactor voor FIC^{1,2}

Heerlijke smaak waar uw huisdier dol op is

Zeer smakelijk, met ingrediënten van hoge kwaliteit zodat uw huisdier na elke maaltijd een tevreden en voldaan gevoel heeft.



1. FIC = Feline Idiopathic Cystitis (Idiopathische Cystitis bij katten);
2. Uitsluitend c/d™ Urinary Stress.